

防カビ効果もある木部処理剤

ケミプロ

オプティガード®

木部処理用20EC乳剤

製品の概要

有効成分	チアメトキサム (防蟻)	2w/w%
	シプロコナゾール (防腐)	2w/w%
	チアベンダゾール (防カビ)	4w/w%

(公社)日本しろあり対策協会認定
登録番号 第7288号

(公社)日本木材保存協会認定
認定番号 A-5384

剤型	乳剤	毒劇物取締法	普通物
外観	淡黄褐色澄明液体	改正建築基準法	シックハウス13指定物質を 含みません
消 防 法	第4類第3石油類		

使用方法

- オプティガード20EC 0.9kgに対して水17.1ℓを均一に希釈した20倍希釈液を300ml/m²となるように木部に塗布または噴霧してください。
- 希釈液は、調製したその日のうちに使い切ってください。
- 他剤との混用は避けてください。
- 水道水を使用してください。
- 食品、食器、飼料、玩具、寝具、衣類、愛玩動物、家畜、観賞魚、植物、貴重品、美術品、楽器、電気器具等はあらかじめ移す、あるいは格納し、本剤がかからないようにしてください。
- 観賞用または装飾用の金属に対しては、本剤がかからないように注意してください。
- 飛沫の付着が心配されるような場所に関しては、変色が起こらないことを確認してください。

特長


- 安全性**：人およびその他の動物、水生動物への毒性が低く、高い安全性が確認されています。
- 効 力**：配合防蟻剤は、食毒と接触毒で致死効果を発揮します。また、配合3主成分は残効性に優れているため防蟻、防腐、防かび効果が期待されます。
- 臭 い**：低臭性で、施工中の異臭発生や残臭の心配はありません。
- 飛散性**：乳剤ですので、水希釈時の粉立ち、飛散の心配はありません。
- 忌避性**：ピレスロイドに比べると忌避性はありませんが、オプティガードZTおよびLTに比べると若干の忌避性があります。



オプティガード[®]とは? 人や環境にやさしい

商品名は、Optimum『最高の』とGuard『守る』から名づけられました。

オプティガードの防蟻成分『チアトキサム』の作用機構



使用上の注意

《使用に関して》

①使用開始前

- ラベルをよく読み、本剤の特長や注意事項、用法、用量を十分理解して使用してください。
- 病人、特異体質者、妊婦、乳幼児等は、薬剤のかからない場所に移動させるよう配慮してください。
- 食品、食器、飼料、玩具、寝具、衣類、愛玩動物、家畜、観賞魚、植物、貴重品、美術品、楽器、電気器具等はあらかじめ移す、あるいは格納し、本剤がかからないようにしてください。
- 飛沫の付着が心配されるような場所に関しては、変色が起こらないことを確認してください。
- 食器にかかった場合は、水と中性洗剤でよく洗浄し使用してください。
- 穀物、特にお米にかかった場合は、処分してください。
- 観賞用、または装飾用の金属に対しては、本剤がかからないように注意してください。
- 保護具(長袖の作業衣、作業帽、保護メガネ、保護マスク、保護靴、ゴム手袋など)および使用する防除器具をあらかじめよく点検、整備し、作業の際には保護具を必ず着用し身体を露出部を少なくし、薬剤を浴びないようにしてください。
- 通気の悪い場所で作業する場合には、局所排気装置を使用するなどして換気に十分注意してください。
- 本剤は、必要量だけ誤飲・誤食の懸念のない適切な器具に分取してください。
- 予想される事柄(かべの染・汚れなど)は、事前に施主の了解を得てください。

②使用中

- 本剤が庭木や草花にかからないよう注意してください。
- 桑に付着する恐れのある場所では使用をさけてください。
- ミツバチを放飼している地域では使用しないでください。
- 本剤処理の場合には、いつも身体を風上に置いてください。
- 散布(顆粒)機の圧力は、できるだけ低くし(5kg/cm²以下)、薬剤が不必要に広がらないように注意してください。

また風の強い場所での本剤の使用を避けてください。

③使用後

- 直ちに石けん水で手や顔をよく洗い、うがいを行ってください。また、衣類は清潔なものに着替えてください。さらに、1日の作業終了後は必ず入浴、またシャワーを浴びてください。
- 空容器は他に転用しないで、回収業者に渡すなど適切に処分してください。

《応急措置》

- 作業中に気分が悪くなったり、本剤を吸い込んで喉などの異常が見られた場合は、すぐに新鮮な空気のある場所に移動し、衣類を緩めて呼吸を楽にしてください(意識のある場合には水等でうがいをしてください)。症状によっては、医師の診断を受けてください。
- 身体に異常を感じた場合や誤って飲み込んだ場合には、直ちに本剤がネオニコチノイド系(チアニコチル系)の殺虫剤であることを医師に告げて診断を受けてください。
- 皮膚の露出部に付着した場合には、すぐに石けん水でよく洗い流してください。症状によっては医師の診断を受けてください。
- 目に入った場合には、直ちに大量の水で十分に洗眼してください(約10分)。症状によっては、医師の診断を受けてください。
- 衣類に付着した場合には、直ちに脱がせ、汚染した皮膚はすぐに石けん水でよく洗い流してください。使用後の衣類は、他の衣類と区別して洗濯してください。
- 河川や池等に流入した場合には、直ちに警察および消防署に通報し、汚染拡大防止に努めてください。

《保管上の注意》

- 専用の倉庫(冷暗所)で保管してください。
- 食品、食器、飼料などと区分し、部外者や幼児、犬、猫などが侵入しないよう施設しておいてください。紛失防止に対処するため、在庫状況、使用量が常時把握できるように管理してください。
- 使用後に残った薬剤は、必ず保管場所に戻し、確実に封入しておいてください。

ケミプロ化成株式会社

- 関東営業所
〒350-1117 埼玉県川越市広栄町8番12号 大黒ビル3階 Tel.049-257-6232 Fax.049-257-6242
- 大阪営業所
〒554-0032 大阪市此花区梅町2丁目1番48号 Tel.06-6461-3611 Fax.06-6461-3990
- 福岡営業所
〒813-0034 福岡市東区多の津1丁目14番1号 FRCビル4階 Tel.092-622-6611 Fax.092-622-6655

お問い合わせ