

シロアリ・床下不快害虫退治

シロアリタックル

特長

- 住まいの大敵シロアリの侵入経路は主として床下からです。対策としては床下に土壤処理を施す方法が非常に効果的です。シロアリタックルは水で希釈して床下土壤に散布するだけで予防が可能です。
- 有効成分は蒸気圧が低く揮散しにくいため住居者に対する安全性が高くなりました。
- 低臭化に取り組みましたので、臭気による住居者の不快感を抑えました。

用途

- シロアリの予防を目的としています。
- クロアリ、ゲジゲジ、ヤスデ、ダンゴムシなど床下不快害虫にも効果を示します。

取り扱い上の注意

- 容器に表示されたラベルやチラシ等に記載してある使用量、方法を厳守して下さい。間違った使い方をすると効力不足や健康を害することがあります。
- 使用後に残った本剤は、本剤の表示のある容器に戻し、密封・密栓して食品等の他のものと区別して保管してください。
- 食品と一緒に運搬しないでください。積み込む前に容器、ラベルを点検し破損品を出荷しないで下さい。


商品性状

- 成 分：防虫・防蟻成分(シラフルオフェン)
- 使 用 容 量：帯状:(5L/m²)・面状:(3L/m²)
- 色 目：透明液体
- 容 量：0.8L(標準処理面積約3~4坪)・3.4L(標準処理面積約12~15坪)
- 毒劇法区分：普通物
- 消防法区分：第四類第三石油類、危険物等級Ⅲ

乳剤 土壌用



0.8L缶 3.4L缶



使用方法

- 水で20倍に希釈してご使用して下さい。
- 基礎・東石及び配管類の立上り部分の周囲の土壤に対し、帯状散布を行います。
- 浴室、便所、玄関等の土壤は、帯状および面状散布を行い、特に入念に処理して下さい。
- 帯状散布：壁際から帯状に20cm幅で、1m当たり1Lの薬剤を散布。
- 面状散布：床下土壤表面全体に、1m²当たり3Lの薬剤を散布。